

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DL 722-6-77114820

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE"

GIROUDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Chemin d'Artigues, 33150 CENON - Tél. 86-22-75 - 86-24-35

ABONNEMENT ANNUEL

50,00 Francs

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,  
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. I BORDEAUX 6702-46 X

21 JUIN 1977 - BULLETIN TECHNIQUE N° 102

## VIGNE

### MILDIOU

Les derniers orages laissent le vignoble à découvert et sont favorables à l'extension de la maladie présente avec plus ou moins de virulence dans toutes les zones viticoles. En outre, la vigne est actuellement en pleine floraison, stade particulièrement sensible au Mildiou.

En conséquence, procéder à une nouvelle pulvérisation dès que possible en suivant les indications données dans le précédent bulletin.

### BLACK-ROT

Des taches isolées apparaissent dans certains vignobles et des foyers sont observés en Armagnac et en Gironde. Le traitement dirigé contre le Mildiou sera efficace contre le Black-rot. Dans les vignobles atteints, nous rappelons que pour les produits suivants, la dose homologuée pour le Black-rot est supérieure à celle homologuée pour le Mildiou (en matière active à l'hectolitre) :

|                | <u>dose Mildiou</u> | <u>dose Black-rot</u> |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| captafol       | 120 g               | 180 g                 |
| dichlofluanide | 125 g               | 250 g                 |
| folpel         | 150 g               | 175 g                 |

### OIDIUM

Dans les situations favorables à l'Oidium, en cette période de floraison, adjoindre un soufre mouillable à la bouillie anti-mildiou ou mieux effectuer un poudrage au soufre.

### CICADELLE (*Empoasca flavescens*)

Actuellement, l'ensemble des vignobles n'héberge que des populations faibles de cicadelles, insuffisantes pour justifier un traitement. Attendre un nouvel avis.

.../...

p 223

ARBORICULTURE

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les captures de papillons restent faibles. Cependant comme les fruits sont relativement peu nombreux, il est prudent de les protéger soigneusement et de procéder à une seconde pulvérisation. (voir bulletin n° 100 pour le choix des produits).

OIDIUM DU POMMIER

Maintenir la protection dans les variétés fortement infestées.

BACTERIOSE DU NOYER

Le traitement précédent ayant été lessivé, renouveler la pulvérisation cuprique.

CARPOCAPSE DES NOIX

Prévoir une pulvérisation insecticide dans le Bergeracois, et le Sarladais. Dans les autres zones, un traitement ne se justifie pas actuellement.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la circonscription phytosanitaire  
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station de BORDEAUX  
Directeur-Gérant : P. JOURNET  
Inscription à la C.P.P.P. n° 524 AD